

Mogą Państwo cierpieć z powodu choroby zwyrodnieniowej stawów i nawet o tym nie wiedzieć.

Jeżeli którekolwiek z poniższych stwierdzeń odnosi się do Państwa, prosimy porozmawiać ze swoim lekarzem.

Kiedy odpoczywam, ból odczuwany przeze mnie w obrębie stawów jest:

- Łagodny Umiarkowany Silny

Kiedy się poruszam, ból odczuwany w obrębie stawów jest:

- Łagodny Umiarkowany Silny

Po obudzeniu lub po odpoczynku moje stawy:

- Nie są sztywne Są trochę sztywne Są bardzo sztywne

Po aktywności fizycznej moje stawy są:

- Wrażliwe Bolesne Spuchnięte Zaczerwienione

Wizualna skala analogowa

Który poziom najlepiej opisuje obecnie odczuwany ból?

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Brak bólu

Umiarkowany ból

Najgorszy wyobrazalny ból

Prosimy opisać swoje ograniczenia

W związku z chorobą zwyrodnieniową stawów, jestem ograniczony/-a w wykonywaniu (codziennych) aktywności:

- Czasami Regularnie Często

Przykłady aktywności, podczas wykonywania których doświadczam ograniczeń, to:

(np. chodzenie pod schodach, uprawianie sportu, podnoszenie się z krzesła, itp.) _____

Prosimy opisać, czego Państwo już próbowali

Próbowalem/-am już:

- Odchudzania i/lub ćwiczeń
 Przyjmowania doustnych środków przeciwbólowych (paracetamol i/lub niesteroidowe leki przeciwzapalne)
 Fizjoterapii

Prosimy opisać swoje cele w zakresie codziennej poprawy

Moim głównym celem w kolejnym etapie leczenia jest:

- Uśmierzenie bólu
 Zredukowanie sztywności stawów
 Zwiększenie poziomu mobilności

Prosimy opisać aspekty lub korzyści dalszego leczenia, które są dla Państwa ważne

Moje leczenie powinno:

- Być bezpieczne i powodować ograniczoną ilość działań niepożądanych
 Na długo uśmierzać ból
 Zwiększać poziom mobilności

Streszczenie wskazań użycia:

DUROLANE (3 ml): Leczenie objawowe łagodnej i umiarkowanej choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego i biodrowego. Preparat DUROLANE został zatwierdzony na terenie UE do leczenia objawowego łagodnego i umiarkowanego bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawu skokowego, barkowego, łokciowego, nadgarstkowego oraz stawów międzypaliczkowych palców rąk, nóg.

DUROLANE SJ (1 ml): Leczenie objawowe łagodnego i umiarkowanego bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawu skokowego, łokciowego, nadgarstkowego oraz stawów międzypaliczkowych palców rąk, nóg. Zarówno preparat DUROLANE, jak i preparat DUROLANE SJ są także wskazane w leczeniu bólu po artroskopii w obecności choroby zwyrodnieniowej stawu w ciągu 3 miesięcy po zabiegu.

Brak znanych przeciwwskazań.

Preparatu DUROLANE nie należy stosować w przypadku zakażeń lub choroby skóry w miejscu iniekcji. Preparatu DUROLANE nie badano u kobiet w ciąży i karmiących piersią ani dzieci. Do zagrożeń mogą należeć: przemijający ból, obrzęk i/lub sztywność w miejscu iniekcji.

Pełną informację dotyczącą produktu można znaleźć w ulotce dołączonej do opakowania, na stronie www.durolane.com.



Bioventus Coöperatief U.A.
Taurusavenue 31
2132 LS Hoofddorp
Niderlandy

Customer Care
T: 00800 3111 376 (bezpłatny)
E: customercare-international@bioventusglobal.com

www.durolane.com
www.BioventusGlobal.com

DUROLANE, Bioventus i logo Bioventus są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bioventus LLC.